

Anhang I – Vorkommende Bodenformen im Amt Odervorland, Legende BÜK 300 (Stand 28.03.2025)

Subtypen	Vorwiegende Substrate	Legendeneinheit nach BÜK 300
Braunerde		
<i>überwiegend podsolige Braunerden und gering verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet podsolige Regosole, Podsol-Regosole und Podsole aus Flugsand über tiefem Schmelzwassersand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	42
<i>verbreitet Braunerden, z.T. podsolig und gering verbreitet vergleyte Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Kolluvisole und gering verbreitet vergleyte Kolluvisole und Gley-Kolluvisole aus Kolluvialsand über tiefem Schmelzwassersand, selten Erdniedermoore aus Torf über Flusssand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	44
<i>verbreitet vergleyte Braunerden und Gley-Braunerden und verbreitet podsolige Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet lessivierte Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand und gering verbreitet vergleyte Braunerden aus Lehmsand über Schmelzwassersand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	45
<i>überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet lessivierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehm</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	54
<i>überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert und verbreitet Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand; gering verbreitet Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand</i>	<i>Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand</i>	59
Braunerde-Fahlerde		
<i>überwiegend Braunerde-Fahlerden und Fahlerden und gering verbreitet pseudovergleyte Braunerde-Fahlerden aus Lehmsand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehm; gering verbreitet Braunerden, meist lessiviert aus Lehmsand oder Sand über Schmelzwassersand; selten Kolluvisole aus Kolluviallehmsand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehm</i>	<i>Lehmsand über Lehm</i>	61
<i>überwiegend Braunerde-Fahlerden und Braunerden-Parabraunerden und gering verbreitet Hortisol-Fahlerden und Hortisol- Parabraunerden aus Lehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm; verbreitet Kolluvisole aus Kolluviallehmsand über tiefem Moränencarbonatlehm</i>	<i>Lehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm</i>	65
Braunerde-Gley		
<i>überwiegend Braunerde-Gleye und verbreitet Gleye und Humusgleye aus Lehmsand über periglaziär-fluviatilem oder Schmelzwassersand; gering verbreitet Gleye und Humusgleye aus Lehmsand über periglaziär-fluviatilem Lehmsand; selten Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Flusssand</i>	<i>Lehmsand über periglaziär-fluviatilem oder Schmelzwassersand</i>	17

<i>überwiegend Braunerde-Gleye aus Sand über periglaziär-fluviatitem Sand; gering verbreitet Braunerde-Gleye und Gley-Braunerden sowie gering verbreitet Gleye und Humusgleye aus Lehmsand über periglaziär-fluviatitem oder Flusssand; selten Reliktgleye und Reliktgley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatitem Sand</i>	<i>Sand über periglaziär-fluviatitem Sand</i>	18
Braunerde-Podsol		
<i>überwiegend Podsole und Braunerde-Podsole, verbreitet Podsol-Braunerden, gering verbreitet vergleyte Podsole und selten Podsol-Regosole aus Flugsand</i>	<i>Flugsand</i>	2
Erdniedermoor		
<i>überwiegend Erdniedermoore aus Torf über Flusssand; gering verbreitet Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Flusssand; verbreitet Anmoor-, Humusgleye und Gleye aus Flusssand; selten Niedermoore aus Torf über tiefem Flusssand</i>	<i>Torf über Flusssand</i>	72
<i>Erdniedermoore aus Torf überwiegend über Flusssand und gering verbreitet über Mudde; gering verbreitet Erdniedermoore aus Torf; gering verbreitet Anmoor- und Humusgleye aus Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	73
<i>Erdniedermoore aus Torf verbreitet über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm und verbreitet über Mudde; gering verbreitet Erdniedermoore aus Torf; gering verbreitet Humus- und Anmoorgleye aus Lehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm</i>	<i>Torf verbreitet über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm</i>	78
<i>Erdniedermoore überwiegend aus Torf und verbreitet aus Torf über Flusssand; gering verbreitet Normniedermoore aus Torf; gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand</i>	<i>Torf über Flusssand</i>	80
Fahlerde-Braunerde		
<i>überwiegend Fahlerde-Braunerden und Fahlerden und verbreitet Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehmsand; gering verbreitet Braunerden und podsolige Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand; selten vergleyte Braunerden und vergleyte Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. über Moränenkarbonatlehmsand</i>	<i>Sand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehmsand</i>	60
<i>überwiegend Fahlerde- und Parabraunerde-Braunerden und gering verbreitet vergleyte Braunerde-Fahlerden, Gley-Fahlerden, Gley-Parabraunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehmsand; gering verbreitet Erdniedermoore aus Torf über Sand</i>	<i>Sand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehmsand</i>	70
Fahlerde-Pseudogley		
<i>überwiegend Pseudogley-Fahlerden und Fahlerde-Pseudogleye aus Sand oder Lehmsand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehm; verbreitet Pseudogleye aus Lehmsand über Lehm, z.T. Moränenkarbonatlehm; gering verbreitet Braunerden, meist lessiviert aus Sand oder Lehmsand über Schmelzwassersand; selten Gley-Pseudogleye und Pseudogley-Gleye aus Sand über Lehm, z.T. über Moränenkarbonatlehm</i>	<i>Sand oder Lehmsand über Lehm</i>	68
Gley		

<i>überwiegend Gleye, Humus- und Anmoorgleye sowie gering verbreitet vergleyte Fahlerde-Braunerden und Gley-Braunerden, meist lessiviert aus Sand oder Lehmsand über Lehm; gering verbreitet Braunerde-Gleye und Gley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	<i>Sand oder Lehmsand über Lehm</i>	19
<i>überwiegend Gleye und verbreitet Humusgleye sowie gering verbreitet Reliktgleye und Relikthumusgleye aus Flusssand; selten Erdniedermoore und Moorgleye aus Torf bzw. flachem Torf über Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	21
<i>vorherrschend Gleye, Humus- und Anmoorgleye aus Flusssand; gering verbreitet Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Flusssand; gering verbreitet Erdniedermoore aus Torf über Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	25
<i>vorherrschend Humusgleye und gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand; selten Erdniedermoore aus Torf über Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	26
<i>überwiegend Humusgleye und gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand; verbreitet Erdniedermoore aus Torf über Flusssand; selten Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	27
<i>überwiegend Humusgleye und Gleye und gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand; gering verbreitet Erdniedermoore aus Torf über Flusssand; gering verbreitet Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	28
<i>überwiegend Gleye aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Anmoorgleye aus Sand über periglaziär-fluviatilen oder Schmelzwassersand, gering verbreitet Humusgleye aus Sand über Schmelzwassersand; selten Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Fluss- oder periglaziär-fluviatilen Sand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	47
Gley-Braunerde		
<i>überwiegend podsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden sowie gering verbreitet Braunerde-Gleye, z.T. reliktsch aus Sand über periglaziär-fluviatilen Sand; gering verbreitet podsolige Regosole, z.T. über Gleyen aus Flugsand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	<i>Sand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	11
<i>überwiegend vergleyte, podsolige Braunerden und podsolige Gley-Braunerden und gering verbreitet vergleyte Braunerden und Gley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	<i>Sand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	14
Gley-Kolluvisol		
<i>podsolige Regosole und podsolige Braunerde-Regosole überwiegend aus Flugsand und verbreitet aus Flugsand über tiefem Schmelzwassersand; gering verbreitet podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand</i>	<i>Flugsand</i>	82
Podsol-Braunerde		
<i>Verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Flugsand; verbreitet podsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatilen Sand; verbreitet podsolige Regosole und Podsole aus Flugsand über tiefem Flusssand</i>	<i>Flugsand</i>	4
<i>überwiegend podsolige, vergleyte Braunerden und vergleyte Podsol-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatilen Sand; gering verbreitet podsolige Regosole und Podsol-Regosole aus Flugsand; gering verbreitet vergleyte Podsol-Braunerden aus flachem Flugsand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	<i>Flugsand über periglaziär-fluviatilen Sand</i>	10

<i>überwiegend podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden und verbreitet podsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatitem Sand; gering verbreitet reliktsch vergleyte Braunerden und Reliktgley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatitem Sand</i>	<i>Sand über periglaziär-fluviatitem Sand</i>	13
<i>podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden überwiegend aus Sand über Schmelzwassersand und gering verbreitet aus Kies führendem Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Podsole und Braunerde-Podsole aus Sand über Schmelzwassersand; selten lessivierte Braunerden aus Sand über Lehmsand oder Lehm sowie vergleyte Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatitem oder Schmelzwassersand</i>	Sand über Schmelzwassersand	43